

Epidemi Boyutu

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), 2003 yılında, tüm dünyada yaklaşık 314 milyon yetişkinde (%8) BGT olduğunu tahmin etmektedir. Bu rakamın, 2025 yılı itibariyle, tip 2 diyabet için tahmin edilen rakamı (333 milyon) geçerek 472 milyona (%9) yükseleceği tahmin edilmektedir. BGT prevalansı, prevalansının 2025 yılına kadar sabit kalacağı tahmin edilen Afrika hariç tüm dünyadaki bölgelerde artmaktadır. İlginç olarak, Afrika ve Güneydoğu Asya'da BGT prevalansı, diyabet prevalansının 2 katından fazladır.

Önemli gerçekler

- Birçok popülasyonda BGT prevalansı, BAG'den daha yaygındır.
- 2003 yılında, BAG, tüm dünyada 314 milyon yetişkinde (%8.2), postprandiyal hiperglisemi ile karakterize bir prediyabet formu olan BGT görüldüğünü tahmin etmektedir.
- Prediyabet prevalansı, tüm dünyada artış göstermektedir.
- 2025 yılı itibariyle, tüm dünyada yaklaşık 472 milyon yetişkinde prediyabet görüleceği tahmin edilmektedir.
- BGT'si olan kişilerin %50'sine kadar olan kısmında 10 yıl içinde tip 2 diyabet gelişecektir.
- Diyabetin tedavisi, bir ülkenin sağlık bütçesinin %5-10'unu oluşturmaktadır ve bu maliyetlerin çoğundan, diyabet komplikasyonlarının tedavisi sorumludur.



Bugün diyabet, çoğu popülasyon için ağır bir yükür. Diyabetin tedavisi, bir ülkenin sağlık bütçesinin %5-10'unu oluşturmaktadır ve bu maliyetlerin çoğundan, diyabet komplikasyonlarının tedavisi sorumludur.



Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), 2003 yılında, tüm dünyada yaklaşık 314 milyon yetişkinde (%8) postprandiyal hiperglisemi ile karakterize bir prediyabet formu olan BGT olduğunu tahmin etmektedir.

Prediyabet prevalansı, tüm dünyada artış göstermektedir.

2025 yılı itibariyle, yaklaşık 472 milyon yetişkinde prediyabet görülecek ve bu rakam, tip 2 diyabet için tahmin edilen rakamın üstündedir. BGT'si olan kişilerin %50'sine kadar olan kısmında 10 yıl içinde tip 2 diyabet gelişecektir.